



Sanierungsverfahren bei MRSA-Trägern

Dauer der Behandlungsphase gemäß Standardschema: ca. 5 bis 7 Tage*

- 1. Dekolonisation der Nasenvorhöfe**
3 x täglich Anwendung einer Mupirocin-Nasensalbe (z.B. Turixin®) =
Mittel der Wahl - alternativ bei Mupirocin-Resistenz: PVP-Iod, 1,25%
- 2. Dekolonisation des Rachenraumes durch entsprechende Anwendungen**
3 x täglich Gurgeln und Spülen mit einer desinfizierenden Lösung (z.B. ProntOral®,
Chlorhexidin-haltigen Präparaten - Chlorhexamed® fluid -, Octenidol®); falls
vorhanden; Prothese einbeziehen
- 3. Ganzkörperantiseptik bei positiven Befunden an anderen Körperstellen**
1-2.x tägl. Ganzkörperwaschung einschließlich der Haare (Dusche oder Vollbad) mit
einer antiseptischen Waschlotion (z.B. Skinsan® scrub; Octenisan®, Decontaman®,
Prontoderm®); dabei unbedingt die Einwirkungszeiten (mindestens 1 Min.) beachten!
- 4. Allgemeine Hygienemaßnahmen sind einzuhalten**

**Für die Dekolonisation des Rachenraumes (2.), die antiseptischen Waschungen (3.)
sowie damit im Zusammenhang stehende Maßnahmen werden von der
Pharmaindustrie spezielle Sanierung-Sets/Kits angeboten.**

* Bei erfolgloser Durchführung können nach ärztlicher Entscheidung ein bis max. zwei
Wiederholungszyklen folgen